





Rame: non è sempre verde
Alternative possibili per la viticoltura biologica
La riduzione e le alternative al rame, la ricerca della FEM

Vinitaly - Verona
09 aprile 2019



Enzo Mescalchin
Unità Agricoltura Biologica
FEM – S, Michele all'Adige (TN)




epoca di comparsa delle
prime macchie di
peronospora in Trentino
(1979-2008)

Epoca del 1° trattamento antiperonosporico consigliato in Trentino (1990-2008)

	1a decade	2a decade	3a decade
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			

Danno su grappolo a fine giugno rilevato in Trentino nel periodo
1979 – 2018 su test non trattati



Cosa serve sapere e fare per usare meno rame

- 1) Dosaggi
- 2) Dilavamento e persistenza
- 3) Effetti sull'ecosistema del suolo

1) i dosaggi



FONDAZIONE
EDMUND
MACH



Prove di distribuzione
in campo dal 2012

alto
esterno (AE)



alto
interno (AI)



basso
esterno (BE)



basso
interno (BI)



FONDAZIONE
EDMUND
MACH





FONDAZIONE
EDMUND
MACH



Con le cartine idrosensibili è possibile stimare il deposito di rame sulla pagina superiore e inferiore della foglia



FONDAZIONE
EDMUND
MACH





FONDAZIONE
EDMUND
MACH



CENTRO TR



FONDAZIONE
EDMUND
MACH





FONDAZIONE
EDMUND
MACH



chiuso il Saliscendi





è possibile stimare il deposito di rame al suolo




FONDAZIONE
EDMUND
MACH



Apporto di rame in zone diverse della vegetazione in funzione del tipo di atomizzatore (a recupero –pneumatico)

Cu apportato (mg/mq)





A-E A-I B-E B-I

25%-75%
Min-Max

Apporto medio di rame – 2013 - Atomizzatore a recupero Friuli (1 = 16/7, 2 = 25/7)

Valli 1 + 2

Media ± ES



Dose Cu: 400 g/ha

Dose Cu: 200 g/ha


Posizione

Le prove di inoculo su dischetti fogliari






Nelle prove di laboratorio su dischetti fogliari si sono sempre usate alte concentrazioni di inoculo, prossime al massimo teorico verificato



% di sporulazione in funzione della concentrazione di sporangi che raggiungono la foglia - prove su dischetti fogliari non trattati - 2014



Deposito di rame sulla vegetazione (mg Cu/m²)
e dose corrispondente (g Cu/ha)

mg Cu/m ² foglie	Spalliera (Guyot) (2,37 ha foglie/ha)	
	dose teorica	con deriva (40%)
3	71	119
5	119	198
10	237	395
15	356	593

Contents lists available at ScienceDirect

Crop Protection

journal homepage: www.elsevier.com/locate/croproEfficacy of reduced copper dosages against *Plasmopara viticola* in organic agricultureAlba Cabús^{a,*,1}, Melissa Pellini^{a,1}, Roberto Zanzotti^a, Luca Devigili^a, Romano Maines^a,
Oscar Giovannini^b, Luisa Mattedi^a, Enzo Mescalchin^a^a Biologic Control Unit, Technology Transfer Center (CTT), Fondazione Edmund Mach (FEM), Via Edmund Mach 1, 38010 San Michele all'Adige, Trento, Italy^b Department of Sustainable Agro-Ecosystems and Bioresources, Research and Innovation Center, Fondazione Edmund Mach (FEM), Via E. Mach 1, 38010 S. Michele all'Adige, Trento, Italy

ARTICLE INFO

Article history:

Received 6 May 2016

Received in revised form

26 January 2017

Accepted 5 February 2017

Available online 16 February 2017

ABSTRACT

The grapevine is the most widely cultivated and economically important fruit species worldwide. Downy mildew produced by *Plasmopara viticola*, which occurs throughout the wide, is one of the most destructive of all grapevine diseases. In organic farming, copper is the only product effective against this pathogen accepted under European organic farming regulation EC 889/2008. Recently, due to its high environmental impact, the use of copper in organic farming has been limited by legislation to a yearly maximum of 6 kg/ha and its use will probably be even more restricted in the future. For this reason, the

Prove di laboratorio (dischetti fogliari)





Fig. 1. Efficacy percentage (%) of Bordeaux mixture at different concentrations. Results from two independent experiments are shown (light and dark grey, respectively). Each bar represents the average of 25 disks distributed in 5 Petri dishes and their standard errors. Within each experiment, different letters indicate significant differences ($P \leq 0.05$) with Tukey's test.


Concentrazione dell'inoculo $1,95 \times 10^5$ sporangi/ml

Efficacia % di dosi diverse di rame – pinot grigio in Trentino loc. S. Donà (2012-2018)

■ 200 grCu/ha ■ 400 grCu/ha ■ 600 grCu/ha




Dose media di rame (g Cu/ha) riportata in etichetta nei diversi formulati rameici presenti sul mercato italiano (2018)



La dose consigliata dalla consulenza in viticoltura biologica varia da 200 a 400 gr/Cu/ha per trattamento

Media delle dosi minime di rame (g Cu/ha) riportate in etichetta nei diversi formulati rameici presenti sul mercato italiano (2018)



La dose consigliata dalla consulenza in viticoltura biologica varia da 200 a 400 gr/Cu/ha per trattamento

► Se passer du cuivre : des marges de manoeuvre importantes

- Une forte réduction des dosages de cuivre est possible, sans autre ajustement des systèmes de culture


Un grand nombre d'études sur des pathosystèmes très variés (mildious de la pomme de terre ou de la vigne, tavelure du pommier...) montrent qu'une **diminution de moitié des quantités de cuivre appliquées**, obtenue le plus souvent en conservant une cadence d'application identique mais en réduisant fortement les doses à chaque passage et en améliorant la qualité de la pulvérisation, **atteindrait, dans la plupart des cas, une efficacité identique ou très comparable** à celle obtenue avec une utilisation à pleines doses. Ainsi, une protection très satisfaisante vis-à-vis de ces parasites peut être fournie par l'emploi de 1,5 kg de cuivre métal par hectare et par an, contre 3 kg/ha/an dans la plupart des programmes "standard". De ce fait, une réduction significative de la quantité de cuivre autorisée ne se traduirait en général pas par une impasse phytosanitaire ou une mise en péril des productions, sauf en cas de très forte pression de maladie.



PEUT-ON SE PASSER DU CUIVRE
EN PROTECTION DES CULTURES BIOLOGIQUES ?

RÉSUMÉ DE L'EXPERTISE SCIENTIFIQUE COLLECTIVE - JANVIER 2018


La possibilità di riduzione dei
dosaggi vale per le diverse
formulazioni di rame?




FONDAZIONE
EDMUND
MACH



Prova di laboratorio su dischetti fogliari: efficacia antisporulante del solfato Cu (non formulato) e poltiglia bordolese (formulato commerciale)




Prova di laboratorio su dischetti fogliari: efficacia antisporulante di 4 Sali rameici commerciali: ossicloruro, idrossido, solfato tribasico, poltiglia bordolese




Prova di laboratorio su dischetti fogliari: efficacia antisporulante di 4 Sali rameici commerciali: ossicloruro, idrossido, solfato tribasico, poltiglia bordolese

Ossicloruro




Idrossido




Concentrazione dell'inoculo
 $1,95 \times 10^5$ sporangi/ml
→ media 981 sporangi/cm²

Solfato tribasico




Poltiglia Bordolese



2) Dilavamenti e persistenza


Non è la persistenza del rame il
fattore limitante ma la crescita della
vegetazione

Dilavamento del rame in funzione del grado di neutralizzazione con calce e della quantità di pioggia




Deposito di rame sulle foglie in funzione delle precipitazioni e degli apporti


Chardonnay su Guyot - Collina Anno 2016




Deposito di rame sulle foglie in funzione delle precipitazioni e degli apporti – 2017 - Incrocio Manzoni




Deposito di rame sul rachide in funzione delle precipitazioni e degli apporti - 2017 - Incrocio Manzoni



Deposito di rame sulle bacche in funzione delle precipitazioni e degli apporti – 2017 - Incrocio Manzoni



Macroaggregato di rame con calcio




BED-C 20.0kV WD10.6mm Std.-P.C.55.1 HighVac. x500

50um

7243


May 10 2018

Macroaggregato di rame e peli sulla superficie inferiore della foglia



BED-C 20.0kV WD10.0mm Std.-P.C.82.6 400Pa x200 100um
7226 May 09 2018

Particelle attive e stomi




3) Effetto del rame sull'ecosistema del suolo




*Paoletti et al., 1998; Van-Zwieten et al., 2004;
Pelosi et al., 2014;*

contenuto di rame assimilabile nel suolo e punteggio QBS -e (lombrichi) Trentino 2016 e 2017 – 34 terreni



<100 Scarso, 100-300 sufficiente, 300-600 discreto, 600-1000 buono, >1000 ottimo

Valori medi QBS-e per vigneti, prati prossimali (8 m) e distali (16 m)
in 10 diverse aree del Trentino




<100 Scarso, 100-300 sufficiente, 300-600 discreto, 600-1000 buono, >1000 ottimo


La sensibilità dei lombrichi all'accumulo di rame (*Sivakumar, 2015*) varia secondo:

- La specie;
- La fase di sviluppo (giovani/adulti);
- La categoria ecologica del lombrico: epigei, endogei, anecici;

Gli endogei (*Paoletti et al., 1998 ; Spurgeon et Hopkin, 1999 ; Dai et al., 2004 ; Riepert et al., 2013*) e gli epigei (*Paoletti, 1999*) sono i più sensibili



Contenuto di rame assimilabile nel suolo e punteggio QBS-ar (artropodi)
Trentino primavera 2017 – 60 campioni in 10 siti diversi



<100 Scarso, 100-300 sufficiente, 300-600 discreto, 600-1000 buono, >1000 ottimo



sinfilo



tisanottero




pseudoscorpione



acaro



dipluro



collembolo



cicala
(larva)




coleottero
(larva)



chilopode


*Liao et al., 2003; Chaussod et al., 2003;
Giovannetti et al., 2006*

le endomicorrize possono controllare il livello e l'assorbimento del rame
nella pianta (*Gonzalez-Chavez et al., 2002 ; Navel et Martins, 2014*)



Bio-protettori contro stress idrici e tossici
(metalli pesanti) (*Jeffries et al., 2003*)

Grado attacco su grappolo 13 luglio 2017 S. Donà – pinot grigio



Grazie dell'attenzione!!



FONDAZIONE
EDMUND
MACH

